

Guepiniopsis buccina (Pers.) L.L. Kenn., *Mycologia* 50: 888 (1958)

Corología

Registro/Herbario: 130806 08 Leg.: J Hernanz, JC Campos, F Gracia, J Cuesta, J Fernández, F Serrano, MA Ribes Det.: Miguel Á. Ribes	Fecha: 13/08/2006	Lugar: Marie Blanque (Pirineo francés) 984m 30T YN0271	Hábitat: Bosque mixto de <i>Abies alba</i> y <i>Fagus sylvatica</i>
---	-----------------------------	--	--


Taxonomía

- **Position in classification:** Dacrymycetaceae, Dacrymycetales, Agaricomycetidae, Basidiomycetes, Basidiomycota, Fungi
- **Basionym:**
[Peziza buccina Pers. 1801](#)
- **Sinonimia:**
 - [Campanella merulina \(Pers.\) Singer](#), *Persoonia* 2(1): 33 (1962)
 - [Ditiola merulina \(Pers.\) Rea](#), *Brit. basidiomyc. (Cambridge)*: 743 (1922)
 - [Guepinia merulina \(Pers.\) Quél.](#), (1884)
 - [Guepinia peziza Tul.](#), *Annls Sci. Nat., Bot., sér. 3* 19: 224 (1853)
 - [Guepiniopsis merulina \(Pers.\) Pat.](#), *Hyménomyc. Eur. (Paris)*: 159 (1887)
 - [Helotium buccina \(Pers.\) Fr.](#), *Summa veg. Scand., Section Post. (Stockholm)*: 355 (1849)
 - [Peziza buccina Pers.](#), *Syn. meth. fung. (Göttingen)*: 659 (1801)
 - [Peziza exarata Berk.](#), *Grevillea* 3(no. 28): 160 (1875)
 - [Phialea exarata \(Berk.\) Sacc.](#), *Syll. fung. (Abellini)* 8: 268 (1889)
 - [Phialea merulina Pers.](#)


Descripción macro

- Pequeños hongos en forma cupuliforme con un pie bastante desarrollado, de carne gelatinosa y color amarillo-naranja. Son muy características de esta especie las estrías longitudinales de la cara externa.

Descripción micro



1. Basidios bispóricos en forma de horquilla



2. Esporas de elipsoidales a cilíndricas. Abajo derecha: células de la cara externa

Medidas esporales:

9,7 [10,8 ; 11,5] 12,7 x 3,6 [4,5 ; 4,9] 5,8

Q = 1,8 [2,3 ; 2,5] 3 ; N = 22 ; C = 95%

Me = 11,2 x 4,7 ; Qe = 2,4