

Orchidaceae

Ophrys algarvensis

D. Tyteca, J. Benito Ayuso & M. Walravens in J. Eur. Orchid. 35(1): 65 (2003)



Localizaciones estudiadas

España, Jaén, Valdepeñas de Jaén, 30SVG 26, 940 m, en pastizal y claros de bosque de *Quercus ilex* y *Quercus faginea*.



A. Hábito.



B. Flor en vista frontal (arriba). Flor en vista lateral (abajo).



Ophrys algarvensis



Ophrys dyris



C. Comparativa de *O. algarvensis* y *O. dyris*.

Observaciones

Se diferencia de [Ophrys dyris](#) porque *O. algarvensis* tiene los sépalos, los pétalos laterales y el labelo más alargados, el labelo también es menos convexo, tiene un color mas rojizo y el vello que tiene es mas corto, además su floración comienza unos 20 días más tarde.

Citada por primera vez en la provincia de Jaén en [LARA RUIZ, J. & S. TELLO MORA \(2009\). Contribución al conocimiento de la orquidoflora del sector subbético jiennense. Micobotánica-Jaén AÑO IV Nº 4 \(2009\).](#)

Descripción y otras fotografías

Tyteca, D., J. Benito & M. Walravens 2003. *Ophrys algarvensis*, a new species from the southern Iberian Peninsula. *Jour. Eur. Orch.* **35(1): 65**: Plant with 2 to 5 (-6) flowers, up to 30-40 cm high. Sepals length 13,9 - 15,8 mm. Lateral petals length 9,8 - 11,7 mm. Lip 15,2 - 19,5 mm long, 11,8 - 15,3 mm wide, with moderate convexity, almost flat at base. Lip hairiness weak at base, stronger at top but remaining short and not exceeding the lip extremity, due to the importance of the brownish to yellowish glabrous margin. Lateral lobes of the lip narrow, slightly backwards recurved. Lip margins forming, at base, an acute angle (28 - 42°) with respect to the central axis on flattened lip. Lip with a comparatively long median lobe, 6,5 - 7,9 mm, reaching 2/3 to usually 4/5 or even more of its width.



Ophrys algarvensis